

خروید در شب می تواند بر عملکرد حافظه و خواب و ال عقل تأثیر بگذارد. یک مطالعه جدید ارتباط بین پنهان اندادی خواب، حافظه و خطر زوال عقل را بررسی کرد. محققان از تست شناختی بر روی بزرگسالان ۴۰ تا ۷۰ ساله برای مقایسه افراد با و بدون اختلال خواب استفاده کردند. افراد مبتلا به آپنه انسدادی خواب، مرمان نشده عملکرد شناختی و حافظه بدتری داشتند. همچنین خطر ابتلا به زوال عقل در آنها بالاتر بود. با این

طاهری اقدام درباره علامت مشابه پارکینسون در مگن
به دو اثر مصرف داروهای ایچاد شود، اظهار کرد: بعضی
روها به ویژه برخی داروهای روان‌گردان، می‌توانند عوارض
ایچاد کنند که شبیه علامت پارکینسون باشد. در چنین شرایطی
ایدل علت بروز علامت توسط پزشک بررسی شود. وی با اشاره به
حذوف برخی فعالیت‌های بیماران مبتلا به پارکینسون
افزاد که این بیماری مبتلا هستند، در انجام کارهایی
به نایز به واکنش سریع دارند اما ممکن است با مشکل مواجه
شوند، بنابراین باید در انجام چنین فعالیت‌هایی احتیاط
کنند. این متخصص مغزو اعصاب با بیان اینکه ارزش سر نیز
می‌تواند در برخی بیماران مبتلا به پارکینسون دیده شود، گفت:
این حال ارزش در بیماری پارکینسون عمدتاً در دست‌های
مشاهده می‌شود. طاهری اقدام درباره امکان پیشگیری
از پارکینسون نیز اظهار کرد: برای این بیماری پیشگیری
شخصی وجود ندارد و دامی که علامت بیماری ظاهر شود، بر
مبنای شرایط بیمار درمان آغاز می‌شود. پارکینسون در
سایر انواع موارد نیز می‌تواند در تشخیص ایجاد می‌شود.

[illegible][illegible]